الفعالية التثبيطية لبعض المبيدات الفطرية في تقليل التلوث الفطري في مزارع أنسجة نخيل التمر

Phoenix dactylifera L.

نجلاء حسين محمد

قسم وقاية النباتات، كلية الزراعة- جامعة البصرة

الخلاصة

نفذت هذه الدراسة لتشخيص التلوث الفطري المصاحب للزراعة النسيجية لكالس أصناف مختلفة من نخيل التمر *Phoenix dactylifera L.* ومحاولة اختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية في تقليل التلوث في مختبرات مركز أبحاث النخيل /جامعة البصرة. أوضحت نتائج عزل وتشخيص الفطريات الملوثة عزل أجناس فطرية مختلفة، سجل فيها الفطر *Aspergillus niger* أعلى النسب المئوية للظهور بلغت ٢٥%، تلاه الفطر *Penicillium sp2* 20% وسجلت النسب المئوية لظهور الفطريات *Alternaria alternata* و *Penicillium sp1* و *Rhizopus sp.* معدل ١٥% لكل الفطريات. وبينت نتائج غرلة المبيدات الفطرية (بنليت و كاريندازايم) تفوق المبيد البنليت الذي أدت معاملته إلى تثبيط نمو الفطريات الملوثة بصورة كلية على الأوساط الغذائية الصلبة والسائلة، كما أثبتت النتائج عدم معنوية تأثير المبيد الفطري البنليت (١غم/لتر) في مؤشرات النمو المدروسة للكالس الجنيني لصنف نخيل التمر الأشقر والتي لم يختلف فيها الوزن الطري والجاف للكالس الجنيني بوجود المبيد عن معاملة المقارنة، كما أدت معاملة المبيد البنليت إلى اختزال النسبة المئوية للتلوث الفطري من ١٠٠% إلى ٤٥%.

الكلمات المفتاحية: زراعة الأنسجة، نخيل التمر، التلوث الفطري، المبيدات الكيميائية.

المقدمة

تعد نخلة التمر *Phoenix dactylifera* L. إحدى أهم أشجار النخيل المثمرة في العالم سيما في بلدان الشرق الأوسط. وبلغ معدل إنتاج النخيل العالمي من التمر بأكثر من ٧.٥ مليون طن في عام ٢٠٠٩، وغطت المساحة المزروعة بنخيل التمر ما يقارب الـ ١.٣ مليون هكتار، شكلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجزء الأعظم منها (Abass, 2013، FAO, 2011). ويتأتى هذا الاهتمام المتزايد بنخيل التمر للقيمة الغذائية العالية لتمورها كونها تمثل مصدراً مهماً للطاقة والعناصر الغذائية الضرورية، وتشكل الكربوهيدرات ما معدله ٧٠% من المحتوى الكلي، و ١٥-٣٠% محتوى مائي، مع العديد من العناصر المعدنية المهمة مثل الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم (Dayani et al., 2012، Thabet et al., 2010).

تتكاثر نخيل التمر بطرق مختلفة منها الإكثار بالبذور Seed Propagation والإكثار بالفسائل Offshoot Propagation والإكثار بزراعة الأنسجة Tissue Culture Propagation، وتتميز تقنية زراعة الأنسجة بالعديد من المزايا المهمة ومنها:

١- إنتاج أعداد كبيرة من نخيل التمر.
٢- عدم وجود أي تأثيرات بيئية أو موسمية تؤثر في إنتاج النخيل النسيجي كون العملية تتم في ظروف تحكمية.

٣- إنتاج نباتات خالية من العوامل الممرضة.

٤- إنتاج نباتات مطابقة من الناحية الوراثية للنبات الأم.

(Kriaa et al., 2011).

وتواجه هذه التقنية الدقيقة العديد من التحديات التي تحد من نجاحها أحياناً ، ومنها التلوث المايكروبي Bacterial Microbial Contamination وبشقيه الفطري Fungal Contamination والبكتيري Bacterial Contamination، وتبرز الفطريات باعتبارها المصدر الرئيس للتلوث في مزارع أنسجة نخيل التمر، والذي ممكن أن يحدث خلال أي مرحلة من مراحل الزراعة النسيجية وذلك لتوافر الظروف الملائمة لنموها من حرارة ورطوبة وضوء، فضلاً عن التنوع الغذائي الذي يوفره الوسط الزراعي المستخدم في الزراعة النسيجية (Falnigan and Morey, 1997). وتتسبب الفطريات الملوثة لمزارع أنسجة نخيل التمر العديد من المشاكل، ومنها تغيير درجة حموضة الوسط و زيادة العكورة و التحلل الإنزيمي بفعل أنزيماتها المحللة وتأثيراتها السامة على الأنسجة (حميد وعباس، ٢٠٠٦).

هدفت هذه الدراسة إلى عزل وتشخيص الفطريات الملوثة لمزارع أنسجة نخيل التمر ومحاولة تحديد أفضل المبيدات الفطرية التي تحد من تأثيراتها السلبية.

مواد وطرق العمل

١- عزل وتشخيص الفطريات

عزلت الفطريات من أنابيب الاختبار الخاصة بزراعة أنسجة عدة أصناف من نخيل التمر كانت ملوثة ظاهرياً بالفطريات، وبلغ مجموع الأنابيب ١٠٠ انبوباً ملوثاً . زرعت الفطريات المعزولة في وسط غذائي مكون من البطاطا والدكستروز والاكار (PDA) مع إضافة المضاد الحيوي كلورومفينيكول بمعدل ١٥٠ ملغم/لتر، وحضنت الإطباق على درجة حرارة ٣٠ °م ± ١ ، تمت تقنية المستعمرات الفطرية بطريقة البوغ المفرد وعلى الوسط PDA وشخصت طبقاً إلى (Eillis 1971). حسبت النسبة المئوية لتكرار الأنواع حسب المعادلة التالية:-

عدد الأنواع الفطرية/عينه

% للتكرار = ----- ١٠٠x

العدد الكلي للأصواع / كل العينات

٢- دراسة تأثير المبيدات الفطرية في نمو الفطريات الملوثة لمزارع أنسجة نخيل التمر.
١-٢ المبيدات الفطرية.

اختبرت المبيدات بنليت و كاربندازيم لبيان تأثيراتها المثبطة في نمو الفطريات المعزولة وبالتراكيز الموصى بها ١ مل أو غم/ لتر.

2-2 تأثير المبيدات الفطرية في نمو الفطريات المعزولة.

حضر الوسط الغذائي الصلب PDA والوسط السائل PD و عقم بجهاز التعقيم البخاري Autoclave على درجة حرارة ١٢١ درجة مئوية وضغط ١.٥ باوند/انج ٢ لمدة ٢٠ دقيقة ثم عولمت بتراكيز المبيدات الموصى بها في أطباق بتري حاويه على الوسط PDA ولقحت مراكز الأطباق بقرص قطره ٠.٥ سم من مستعمرات الفطريات المدروسة، وحضنت بدرجة حرارة ٣٠±١ ° م (عباس، ٢٠٠٤) وحسبت النسبة المئوية لتنشيط النمو الشعاعي والوزن الجاف للفطريات المعاملة بالمبيدات.

٣-٢ تأثير المبيدات في نمو الكالس الجنيني.

نفذت هذه التجربة في مركز أبحاث النخيل إذ استخدمت مادة الـ MS العضوية (١٠ سم^٣/ ٧٠٠ سم^٣ ماء مقطر (Murashing and Skoog, 1962)، كما أضيفت معادن غير عضوية للوسط (Tisserat, 1991) وقد أضيفت منظمات النمو و كالاتي:

٣ ملغم لكل لتر من مادة نفتالين حامض الخليك NAA و ٣ ملغم من مادة zip ونظمت حموضة الوسط على ٥.٧ باستخدام هيدروكسيد الصوديوم NaOH وحامض الهيدروكلوريك HCl وأضيف ٨ غم من الأكار لكل لتر من الوسط ثم صب ٢٥ مل في أنابيب الاختبار، وبعد التعقيم بالبخار أجريت المعاملات التالية:

١- المعاملة بالبنليت (١ غم/لتر) في أنابيب اختبار مزروعة بالكالس.

- ٢- معاملة السيطرة زرعت بالكالس فقط .
 ٣- المعاملة بالبنليت لكالس صنف الأشقر .
 ٤- معاملة السيطرة لكالس صنف الأشقر .

حضنت أنابيب الاختبار في الحاضنة لمدة ٤٥ يوماً وبدرجة حرارة 27 ± 1 ° م وفترة إضاءة ١٦ ساعة / لوكس وبعد انتهاء مدة الحضن أخذت القراءات التالية الوزن الرطب والجاف للكالس (ملغم) والنسبة المئوية للتلوث الفطري باستخدام المعادلة التالية :

عدد أنابيب الاختبار الملوثة

$$\% \text{ للتلوث الفطري} = \frac{\text{عدد أنابيب الاختبار الملوثة}}{100} \times 100$$

عدد الأنابيب الكلي

حسبت هذه العوامل باستخدام كالس جنيني ملوث وسطح معقم ٥% هايبوكلورايت الصوديوم وإضافة قطرتين من مادة Tween ٢٠ لمدة ١٠ دقائق ثم زرع في وسط غذائي مضاف له المبيد الفطري البنليت بتركيز ٠.١ غم / لتر.

٣- التحليل الإحصائي.

استخدم التصميم العشوائي الكامل CRD لكافة التجارب باستخدام ٤ مكررات لكل عامل، حولت النسب المئوية زاوياً وقورنت المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي RLSD تحت مستوى احتمال ١% (الراوي وخلف الله، ١٩٨١).

النتائج والمناقشة

- ١- التلوث الفطري لزراعة نخيل التمر النسيجية.

عزلت مجموعة مختلفة من الفطريات من أصناف متعددة لنخيل التمر المزروعة نسيجياً، من المجموع الكلي لأعداد العينات المحسوبة (١٠٠) عينة كان الفطر *Aspergillus niger* من أكثرها تردداً وقد بلغت النسبة المئوية للتردد ٢٥%، تلاه الفطر *Penicillium sp2* بنسبة ظهور بلغت ٢٠%. وبلغت النسب المئوية للظهور ١٥% للفطريات *Alternaria alternata* و *Penicillium sp1* و *Rhizopus sp.* على التوالي وكما موضح في الشكل (١) الصورة (١). اتفقت نتائج دراسة مسح الفطريات الملوثة لمزارع أنسجة نخيل التمر مع بعض الدراسات التي بينت سيادة أنواع تابعة للأجناس *Aspergillus* و *Penicillium* و *Alternaria* (حميد وعباس، ٢٠٠٦، عباس وجماعته، ٢٠٠٧، المياحي وجماعته، ٢٠١٠). أن السيادة العالية لنوع الفطر *Aspergillus niger* قد تعزى إلى مقدرته العالية على النمو في بيئات مختلفة وسيادته في مجتمع الفطريات الهوائية ومجتمع فطريات التربة (Samson et al., 2002)، فضلاً عن كونه من الفطريات المترمة ذات النشاط الإنزيمي العالي (Schuster et al., 2002) مما يوفر فرصة تنافسية جيدة له للنمو في مزارع أنسجة نخيل التمر. أما ما يخص الفطر *A. alternata* فقد بينت بعض الدراسات مقدرته العالية على إفراز الإنزيمات التحليلية مثل السليليز واللايبيز والبروتيز بكفاءة عالية (حميد وعباس، ٢٠٠٦)، ومقدرته على النمو وكفاءة عالية في بيئات مختلفة وتحت ظروف متباينة (Shelton et al., 2002).

شكل (١): النسب المئوية لظهور الفطريات الملوثة لمزارع أنسجة نخيل التمر.

الصورة (١): الفطريات الملوثة والسائدة في مزارع أنسجة نخيل التمر.

A- *Penicillium* sp. B- *Aspergillus niger* C- *Alternaria alternata* D. *Rhizopus* sp.

٢- فعالية المبيدات في تثبيط النمو الفطري لفطريات الملوثة لزراعة أنسجة نخيل التمر.

أشارت نتائج فعالية المبيدات الفطرية إلى مقدرة المبيد بنليت في تركيز ١ ملغم/ لتر في تثبيط كلاً من مؤشري النمو الطري والوزن الجاف بصورة كلية (١٠٠%)، إذ لم تتمكن جميع الفطريات المختبرة من النمو على الأوساط السائلة والصلبة الحاوية على المبيد بنليت (جدول ١ و ٢). وسجل الفطر *A. alternata* أعلى معدلي تثبيط للنمو القشري والوزن الجاف بلغتا ٧٨.٣٠ و ٨١.٦٧%، على التوالي.

جدول (١) فعالية المبيدات الفطرية في تثبيط النمو القشري (%) للفطريات الملوثة لمزارع أنسجة نخيل التمر.

معدل الفطر	المبيدات		الفطريات
	كاريندازايم	بنليت	
a٨٢.٥	٦٥	١٠٠	<i>Alternaria alternata</i>
b٧٥	٥٠	١٠٠	<i>Aspergillus niger</i>
b٧٠	٤٠	١٠٠	<i>Penicillium sp2</i>
	b٥١.٦٧	a١٠٠	معدل المبيدات

جدول (٢) فعالية المبيدات الفطرية في تثبيط النمو الجاف (%) للفطريات الملوثة لمزارع أنسجة نخيل التمر.

معدل الفطر	المبيدات		الفطريات
	كاريندازايم	بنليت	
a٨٥	٧٠	١٠٠	<i>Alternaria alternata</i>
b٧٩	٥٨	١٠٠	<i>Aspergillus niger</i>
b٧٥	٥٠	١٠٠	<i>Penicillium sp2</i>
	b٥٩.٣٢	a١٠٠	معدل المبيدات

أثبتت نتائج الدراسة الحالية تأثيراً واضحاً لمبيد البنليت في تقليل النمو الشعاعي للفطريات المستخدمة وهذا يتفق مع دراسات أخرى أوضحت كفاءة استخدام مبيد البنليت في تثبيط النمو للفطر *M. scattae* المسبب لمرض تعفن النورات الزهرية الذي يصيب نخيل التمر، والفطر *F. solani* العامل المسبب لتدهور السايكس (عباس، ٢٠٠٤ و عباس وجماعته، ٢٠٠٤). كذلك اتفقت مع نتائج دراسات أخرى بينت إمكانية استخدام

المبيدات الفطرية وكفاءة جيدة للحد من تأثيرات الملوثات الفطرية في مزارع أنسجة نخيل التمر، كمبيد الكاربيندازيم والسكرور (الكعبي، ٢٠٠٤).

إن قابلية المبيدات الفطرية على تثبيط نمو الفطريات يعود إلى تأثيرها في عمل الإنزيمات التنفسية والذي ينعكس سلباً على إنتاج الطاقة، ومن ناحية أخرى فإن للمبيد القدرة على التفاعل مع الأحماض الامينية المكونة للبروتين (Gottel and Jaronski, 1997)، أو قد يعزى تأثير مبيد البنليت من خلال إنتاج مركب (MBC) (Methyl Benzimidazole Carbomat) المعروف بتأثيره في إنبات الفطريات طبقاً لدراسة (Darvas) (1977).

٣-فعالية المبيد بنليت في نمو الكالس الجنيني لنخيل التمر.

بينت نتائج تأثير المبيد بنليت بتركيز ١ غم/ لتر عدم وجود أي تأثير تثبيطي يذكر في مؤشرات النمو المتعلقة بكالس صنف نخيل التمر الاشقر، فقد كان معدل الوزن الطري (ملغم) للكالس ٤٥٠ ملغم في معاملة المقارنة ولم يختلف معنوياً عما سجل في معاملة المبيد بنليت والذي بلغ ٤٤٠ ملغم. كذلك لوحظ عدم التأثير لمؤشر الوزن الجاف (ملغم) والذي كان ٢٥ ملغم في معاملة المقارنة و ٢٤ ملغم في معاملة المبيد، ومن الجدير بالذكر أن معاملة المبيد بنليت أدت إلى تقليل معدلات التلوث الفطري من ١٠٠% إلى ٤٥% عند التركيز ١ غم/لتر.

من خلال ما قدمته النتائج السابقة من كفاءة المبيد بنليت في الحد من النمو الفطري بمؤشري النمو القطري والجاف، فضلاً عن عدم وجود تأثيرات معنوية للمبيد البنليت في مؤشرات الأنسجة المدروسة، لذا فإن التركيز ١ ملغم /لتر من المبيد ينصح باستخدامه بشكل آمن وتطبيقي للسيطرة على التلوث الفطري في مزارع أنسجة النخيل.

المصادر

حميد، محمد عبد الرزاق، عباس، محمد حمزة. ٢٠٠٦. دراسة التغيرات النسيجية المصاحبة لتشوب مزارع أنسجة نخيل التمر بالفطريات. مجلة أبحاث البصرة (العلميات) ٣٢ (ب): ١٥-٢٧.

عباس، محمد حمزة. 2004 . كفاءة بعض المبيدات الفطرية في تثبيط نمو الفطر *Mauginilla scattae* ، المسبب لمرض خياس طلع النخيل في البصرة. مجلة البصرة للعلوم الزراعية، المجلد 17 العدد ٢.

عباس، محمد حمزة، حميد، محمد عبد الرزاق وجاسم، عباس مهدي. 2004 . أول تسجيل لمرض الذبول الفيوزارمي على نخيل السايكس *Cycas revolute* المتسبب عن الفطر *Fusarium solani* في العراق. مجلة البصرة للعلوم الزراعية. المجلد 17، العدد 3.

عباس، محمد حمزة، العبادي، أسامة علي محسن، الكعبي، أنسام مهدي. ٢٠٠٧. كفاءة مستخلص أوراق نبات الحناء وبعض المبيدات الفطرية في تقليل التلوث *Phoenix dactylifera* L. الفطري في مزارع أنسجة نخيل التمر. المجلة العراقية لعلوم التقانات الإحيائية، ٦(٢): ٢١-٤٠.

الراوي، خاشع محمود وخلف الله، محمد عبد العزيز. 1980 . تصميم وتحليل التجارب الزراعية. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ص 488.

الكعبي، أنسام مهدي صالح. 2004. تأثير بعض المضادات الحياتية والمبيدات الفطرية في نمو الكالس الجنيني لنخلة التمر *Phoenix dactylifera* L. مجلة البصرة لأبحاث نخلة التمر. مجلد 3، العدد 1.

المياحي، أحمد ماضي، ناصر، علاء أحمد، الخليفة، عقيل عبود. ٢٠١٠. عزل وتشخيص الفطريات المصاحبة لزراعة أنسجة خمسة أصناف من نخيل التمر نسيجياً وكفاءة المبيدات في السيطرة عليها. مجلة البصرة لأبحاث نخلة التمر، ٩(٢): ٧٩-٩٧.

Abass, M.H. 2013. Microbial contaminants of date palm (*Phoenix dactylifera* L.) in Iraqi tissue culture laboratories. Emir. J. Food Agric. 25 (11): 875-882.

- Darvas, J. M. 1977. Control of post harvest disease on Avocado fruit by fungicides with special emphasis on Tecto and Benlate. Association Proceeding of Technical committee. 1:11-14.
- Dayani, O., A. Khezri and A.G. Moradi. 2012. Determination of nutritive value of date palm by-products using in vitro and in situ measurements. Small Rum. Res. 105:122-125.
- Eillis, M. B. 1971. More Diatomaceous hyphomycetes. Commonwealth, Mycological Institute. England 608 pp.
- FAO. 2011. FAOSTAT agriculture. <http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor>.
- Flannigan B. and P.R. Morey. 1996. Control of moisture problems affecting biological indoor air quality: International Society of Indoor Air Quality and Climate, Ottawa, Canada, ISIAQ Guideline TF1-1996.
- Gottel, M.S. and Jarnoski, S.T. 1997. Safety and registration of microbial agents for control grasshopper and lucost. Memories of the Entomological society of Canada. 171: 83-99.
- Kriaa, W., B. Sghaire-Hammami, R. Masmoudi-Allouche and N. Drira. 2011. The date palm (*Phoenix dactylifera* L.) micropropagation using completely mature female flowers. C.R. Biol. 335:194-204.
- Murashig, T. and Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassay with Tabacco tissue culture. Physiol. Plant. 15: 473-479.
- Samson R.A., J. Houbraken, R.C Summerbell, B. Flannigan and J.D. Miller. 2002. Common and important species of fungi and actinomycetes in indoor nvironments. In: Flannigan, B., R.A. Samson and J.D. Miller (Eds.) pp. 287-292. Microorganisms in Home and Indoor Work Environments. New York, Taylor & Francis.
- Schuster, E., N. Dunn-Coleman, J.C. Frisvad and P.W. Van Dijck. 2002. On the safety of *Aspergillus niger*- a review. Appl. Microbiol. Biotech. 59(4/5):426-435.
- Shelton, B.G., K.H. Kirkland, W.D. Flanders and G.K. Morris. 2002. Profiles of airborne fungi in buildings and outdoor environments in the United States. Appl. Env. Microbiol. 68:1743-1753.

Thabet, I., F. Francis, E. de Paw, S. Besbes, H. Attia, C. Devanne and C. Blecker. 2010. Characterisation of proteins from date palm sap (*Phoenix dactylifera* L.) by a protein approach. *Food Chem.* 123:765-770.

Tisserat, B. 1991. Clonal propagation of Palms Plants tissue culture manual, C2 :1-14.

Inhibitory efficiency of some chemical fungicides in reducing the fungal contamination of date palm (*Phoenix dactylifera* L.) tissue cultures.

Najlaa H Muhammed

Plant protection Department, Agriculture College

University of Basrah.

Abstract

The current study has been conducted to isolate and identify the fungal contamination associated with date palm (*Phoenix dactylifera* L.) tissue cultures of different date palm cultivars callus, and the attempt to find the best fungicide to reduce them. Results explained that the most abundant fungal contaminant was *Aspergillus niger* and reported the frequency percent of 25%, followed by the fungus *Penicillium* sp2. Whereas, the genera of *Alternaria*, *Penicillium* and *Rhizopus* reported the percents of 15%. The test of inhibitory efficiency of different fungicides revealed the activity of Benlate in reduction of both fungal radial growth and dry growth at the concentration of 1 g/l. All of tested contaminants failed completely in their growth on solid and liquid PD media containing Benlate fungicide. Its noteworthy, that the concentration of Benlate 1 g/l had no significant effect on the callus growth, the fresh and dry weight of date palm cv. Asker did not differed in both control and Benlate treatment. The percent of fungal contamination was reduced significantly from 100% to a 45% at the treatment of Benlate at 1 g/l concentration.

Keywords: Tissue culture; Date palm; Fungal contamination; Chemical fungicides.